



## PRZYGOTOWANIE DO BADANIA PANEL CLOSTRIDIUM

### **2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania:**

Należy zakończyć stosowanie antybiotyków, środków przeciwpasożytniczych oraz przeciwgrzybiczych, a także probiotyków, inhibitorów pompy protonowej (popularne leki na zgagę), preparatów zawierających bizmut (kontrasty).

### **1 tydzień przed pobraniem materiału do badania:**

Należy zakończyć stosowanie aspiryny, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. leki przeciwbólowe bez recepty), enzymów trawiennych, środków przeczyszczających (szczególnie olej mineralny, olej rycynowy i gliceryna wlewki/czopki), węgla aktywnego, chlorowodoru betainy, leków zobojętniających kwas lub glinki bentonitowej.

Nie należy pobierać próbek podczas menstruacji bądź podczas występowania krwawienia z hemoroidów.

Jeżeli był wykonywany zabieg kolonoskopii bądź lewatywa należy odczekać ok. 4 tygodni zanim pobierze się próbkę.

Przed pobraniem próbki kału należy zachować szczególną ostrożność aby nie zanieczyścić ją moczem bądź wodą z toalety.

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza.