



## PRZYGOTOWANIE DO BADANIA PROFIL MYKOTOKSYN GPL-MYCOTOX

### **2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania:**

Należy odstawić przyjmowane antybiotyki oraz leki przeciwgrzybicze.

### **3 dni przed pobraniem materiału do badania:**

Nie należy spożywać witaminy C, surowych i suszonych owoców i warzyw, a także soków owocowych i warzywnych oraz suplementów zawierających wyciągi z owoców i warzyw. Należy zakończyć stosowanie: glutationu, węgla aktywnego, glinki bentonitowej.

### **1 dzień przed pobraniem materiału do badania:**

Nie należy przyjmować zbyt dużych ilości płynów, aby nie rozcieńczyć moczu. Zaleca się ograniczenie spożycia płynów w dniu poprzedzającym wysyłkę, a od godziny 18:00 nieprzyjmowania płynów w ogóle.

Zaleca się spożycie ostatniego posiłku ok. godz. 18:00 (12-godzinny post przed pobraniem może zwiększać wydzielanie mykotoksyn z tkanki tłuszczowej).

Osoby przyjmujące preparaty zawierające mykofenolan mofetylu mogą uzyskać niemiernodajne wartości parametru - Kwas mykofenolowy. Pozostałe parametry będą oznaczone poprawnie. W przypadku stosowania preparatów z tym składnikiem, proszę umieścić informację o przyjmowaniu mykofenolan mofetylu w dołączonej do zestawu ankiecie.

Kobiety nie powinny pobierać próbki do badania w trakcie menstruacji.

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza.