



PRZYGOTOWANIE DO BADANIA GI EFFECTT

Badanie wykonywane jest powyżej 2-ego roku życia.

Należy odczekać co najmniej 4 tygodnie od wykonania kolonoskopii lub lewatywy z baru przed rozpoczęciem testu.

Przed odstawieniem jakichkolwiek leków należy skonsultować się z lekarzem. Niektóre leki i / lub suplementy mogą wpływać na wynik testu.

Minimum 2, a zalecane są 4 tygodnie przed badaniem:

Odstawić antybiotyki, środki przeciwpasożytnicze, przeciwgrzybicze, suplementy probiotyczne (acidophilus itp.).

W przypadku dodania do testu H. pylori (add on), należy przerwać stosowanie inhibitorów pompy protonowej (PPI) oraz bizmutu na 14 dni przed.

2 dni przed pobraniem materiału do badania:

Odstawić aspirynę i inne NLPZ (np. Ibuprofen), czopki doodbytnicze, lewatywy, węgiel aktywowany, bizmut, HCL betainy, enzymy trawienne, leki zobojętniające, środki przeczyszczające, olej mineralny, olej rybcynowy i / lub glinę bentonitową.

Nie należy pobierać próbek, gdy występuje aktywne krwawienie z hemoroidów lub miesiączki.

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza.