



PRZYGOTOWANIE DO BADANIA ANALIZA PIERWIASTKOWA Z ERYTROCYTÓW PROFIL PODSTAWOWY

Kortykosterydy mogą wpłynąć na niektóre markery w tym teście. Wyniki laboratoryjne mogą posłużyć wykazaniu ich wpływu. Lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi przerwanie ich przyjmowania przez określony okres czasu przed badaniem.

4 dni przed pobraniem próbki krwi:

Należy zakończyć stosowanie wszystkich leków i suplementów diety zawierających składniki mineralne (pierwiastki), które nie są dla pacjenta niezbędne, chyba że lekarz prowadzący zaleci inaczej. Nigdy nie należy przerywać stosowania leków bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

1 dzień przed pobraniem próbki:

Należy unikać spożywania alkoholu i owoców morza. Należy spożywać wyłącznie lekko strawne posiłki oraz podwoić podaż płynów.

W dniu pobrania próbki:

Zalecane jest pobranie krwi rano, na czczo. Inne warunki pobrania próbki krwi mogą zaburzyć wyniki badania.

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza.